

幼兒預防疫苗計劃

ELITE
ELITE CLINIC
俊匯專科醫療中心

初生嬰兒及小童特別容易受細菌及病毒感染，而無孔不入的傳染病更成為寶寶的威脅。

父母親應安排子女接受完善的預防疫苗注射，提供最全面的保護，預防病菌侵害，讓寶寶健康成長，並為身心發展奠定良好的根基。

俊匯專科醫療中心的幼兒預防疫苗計劃，不但為初生至歲半嬰兒提供疫苗注射，更以專業知識及豐富經驗協助父母親照顧新生嬰兒，減除父母不必要的憂慮。



幼兒疫苗計劃可預防以下之疾病：

輪狀病毒感染引起的病徵包括嘔吐、腹瀉及發燒。由輪狀病毒引起的腸胃炎可導致嚴重脫水，引致主要器官如腦部、心臟及腎臟衰竭，幼兒於出生後6星期便可以開始服用輪狀病毒口服疫苗。

乙型流感嗜血桿菌(Hib)可引起多種幼兒嚴重的疾病，包括：腦膜炎、肺炎、敗血病等，並可導致死亡或其它嚴重的後遺症。在美國，Hib是最常見引致幼童患腦膜炎的細菌，因此其政府早已全面為幼兒接種此疫苗。

百日咳患者初時流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽。但咳嗽會日益嚴重和加劇，妨礙病人飲食和呼吸，細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒。



破傷風由破傷風梭狀芽胞桿菌的細菌所引致。病者身軀產生普遍性的肌肉痙攣，嚴重者不能吞嚥或張口。破傷風一旦影響輔助呼吸的肌肉組織，便會使病人迅速死亡。

白喉是由白喉棒狀桿菌所引致。患者以兒童為主，病菌會令人發燒、喉痛。嚴重者會呼吸道閉塞、心臟衰竭，甚至死亡。

小兒麻痺由脊髓灰質炎病毒所引致。脊髓灰質炎病毒會令人發燒、頭痛、嘔吐、腹部不適、肌肉劇痛、頸背僵硬及麻痺。嚴重者會導致腦膜炎甚至死亡。

乙型肝炎常見症狀包括發燒、食慾減退、噁心、嘔吐、腹痛、眼白變黃，病者可能會成為帶菌者，並可能會變成慢性肝炎，肝臟永久損壞或肝癌。

麻疹由麻疹病毒引起。受感染的人初時會咳嗽、流鼻水、發燒、眼紅及出現紅疹。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，嚴重甚至死亡。

流行性腮腺炎以1歲以上的小童最為普遍。病徵包括兩頰唾腺腫痛，間中或會出現失聰及腦部、胰臟、睪丸或卵巢受感染等併發症。

德國麻疹患者會出疹、輕微發燒及淋巴結脹大。孕婦如果在懷孕首3個月感染所誕下的嬰兒可能會患上先天性德國麻疹綜合症，導致失聰、眼部缺陷、心臟畸形及智力發展遲緩。

肺炎鏈球菌是最常見導致兒童患上肺炎及中耳炎的細菌，也是腦膜炎的主要原因之一，可導致其他永久的後遺症，甚至死亡。



疫苗注射的建議時間表：

針數視乎選用那一種注射時間表，詳情可向醫生查詢。

年歲	一般疫苗注射時間表	簡便的疫苗注射時間表
初生	卡介苗 — 只需一針	
	乙型肝炎疫苗(Hep B) — 第一針	
一個月	乙型肝炎疫苗(Hep B) — 第二針	—
兩個月	5合1無細胞(DTPa—IPV/Hib)混合疫苗 — 第一針#	6合1無細胞(DTPa—IPV—HBV/Hib)混合疫苗 — 第一針+
	口服輪狀病毒疫苗 ▲	
	肺炎鏈球菌接合疫苗 — 第一針	
四個月	5合1無細胞(DTPa—IPV/Hib)混合疫苗 — 第二針#	6合1無細胞(DTPa—IPV—HBV/Hib)混合疫苗 — 第二針+
	口服輪狀病毒疫苗 ▲	
	肺炎鏈球菌接合疫苗 — 第二針	
六個月	5合1無細胞(DTPa—IPV/Hib)混合疫苗 — 第三針#	6合1無細胞(DTPa—IPV—HBV/Hib)混合疫苗 — 第三針+
	乙型肝炎疫苗 (Hep B) — 第三針	
	肺炎鏈球菌接合疫苗 — 第三針	
1歲	麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹(MMR)混合疫苗 — 第一針	
1歲或以上	水痘針 — 只需一針	
	甲型肝炎(Hep A) — 共二針，需相隔六個月	
十二至十五個月	肺炎鏈球菌接合疫苗 — 加強針	
1歲半	5合1無細胞(DTPa—IPV/Hib)混合疫苗 — 加強針#	

* 需自行到私家診所或私家醫院自費注射。

\+ 6合1無細胞預防疫苗可同時預防「白喉」、「破傷風」、「百日咳」、「小兒麻痺」、「乙型流感嗜血桿菌」及「乙型肝炎」。

\# 5合1無細胞預防疫苗可同時預防「白喉」、「破傷風」、「百日咳」、「小兒麻痺」及「乙型流感嗜血桿菌」。此兩種疫苗暫時只在私家診所或私家醫生提供，詳情可向醫生查詢。

▲ 嬰兒需於第六至第二十四星期大內完成共2劑之輪狀病毒口服疫苗，而每劑疫苗須相隔至少四星期。此療程乃根據其中一所疫苗製造商的建議而制定，詳情可向醫生查詢。

6合1/5合1無細胞預防疫苗的優點

1. 優質無細胞疫苗可提高免疫效果

現時一般的無細胞百日咳疫苗只包含PT及FHA兩種抗原成分。而優質的6合1/5合1無細胞百日咳疫苗除了包含PT及FHA外，還加上了第3種抗原成分PRN。PRN抗原疫苗配方能增加疫苗對免疫系統的刺激，大大增強對百日咳的免疫效果。

百日咳疫苗比一比

	一般無細胞百日咳疫苗	優質6合1/5合1無細胞百日咳疫苗
百日咳疫苗成份	PT, FHA	PT, FHA, PRN
百日咳疫苗效能	58.9%	84%

2. 注射6合1或5合1疫苗可減少打針次數

於一般分開式疫苗注射計劃中，嬰兒初生至1歲半，需要注射疫苗共13針◇。多次的注射，令嬰兒感到痛楚之餘，父母亦會非常擔心。選擇6合1/5合1無細胞預防疫苗，於一針內同時預防6種/5種疾病：百日咳、破傷風、白喉、乙型流感嗜血桿菌、乙型肝炎及小兒麻痺，可大大減少注射次數多達6針。

◇包括「百日咳」、「破傷風」、「白喉」、「乙型流感嗜血桿菌」、「乙型肝炎」、「小兒麻痺」、「卡介苗」、「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹」疫苗

ELITE ELITE CLINIC 俊匯專科醫療中心

應診時間

星期一至五　10:00 — 13:00
　　15:00 — 18:30
星期六　10:00 — 14:30
* 星期日及公眾假期休息

* 敬請預約

預約電話：2684 1000

九龍尖沙咀彌敦道26號25樓3—5室
(港鐵尖沙咀站D1出口或尖東站K出口)
傳真：2684 9000
網址：www.eliteclinic.hk

